

จดหมายข่าวยา refer back
ประจำปีงบประมาณ 2564 เริ่มใช้ 1
พ.ย.63



๑. Lercanidipine ๒๐ mg. (LERCADIP®)

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต :

ข้อบ่งใช้ : ใช้ลดความดันโลหิตสูงชนิดอ่อนถึงปานกลาง โดยอาจใช้เป็นยาเสริม
เมื่อใช้ยาลดความดันตัวเดียวไม่ได้ผล อาจใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม beta blocker
ยาขับปัสสาวะ, หรือยาในกลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor

**** (ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทน
ต่อผลข้างเคียงของยา amlodipine ไม่ได้)****

เงื่อนไข : บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ข

กลุ่มยา : Calcium channel blockers
(Dihydropyridines)



ขนาดยา : ขนาดเริ่มต้น รับประทานวันละ ๑ ครั้งๆละ ครั้ง เม็ด (๑๐ mg.)
สามารถปรับเพิ่มสูงสุดเป็น ๓๐ mg. ได้กรณีไม่ตอบสนองต่อยา

กลไกการออกฤทธิ์ :

ออกฤทธิ์โดยตัวยาลดการนำเข้าของแคลเซียมเข้าในกล้ามเนื้อ
หลอดเลือด
ขยายตัว ทำให้ความดันโลหิตลดลง รวมถึงลดการหดบีบตัวของหัวใจอีกด้วย

ผู้ป่วยโรคตับ : ไม่ควรใช้ยาดังกล่าวในผู้ป่วยที่มีโรคตับรุนแรง

ผู้ป่วยโรคไต : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีค่า CrCl < ๓๐ ml/min

อาการข้างเคียง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ใจสั่น, หัวใจเต้นเร็ว, peripheral edema, ร้อนวูบวาบ

ระบบประสาท : ปวดหัว และเวียนศีรษะ

ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และท้องเสีย

ผิวหนัง : ผื่นคัน

ข้อห้ามใช้/ควรระวัง :

ห้ามใช้ : - ผู้ป่วยที่แพ้ยานี้

- ผู้ป่วยที่มีอาการอุดตันของ left ventricular outflow , CHF

unstable angina pectoris, ผู้ป่วย MI ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา

ผู้ป่วยที่ได้ยาในกลุ่ม strong CYP3A4 inhibitors(etc. ketoconazole)

, cyclosporin และ grapefruit juice

ควรระวัง : ผู้ป่วย sick sinus syndrome

ราคา : ๔.๐ บาท/เม็ด

Pregnancy Cat : C



๒. Fenofibrate ๒๐๐ mg. (LIPANTHYL(micronized)®)

ข้อบ่งใช้ : ใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูง (hypercholesterolaemia) และภาวะ

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต :

ผู้ป่วยโรคตับ : ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ

ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (hypertriglyceridaemia)

เงื่อนไข : ยาในปัญหาหลักแห่งชาติ บัญชี ค.

กลุ่มยา : Fibric Acid Agent



ขนาดยา : รับประทานครั้งละ ๒๐๐ mg. วันละ ๑ ครั้ง
(การรับประทานยาพร้อมอาหารช่วยเพิ่มการดูดซึมของยา)

กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ในการลดระดับ triglyceride ในเลือด โดยการกระตุ้นการทำงานของ peroxisome-proliferator activated receptor α ซึ่งการทำงานของ lipoprotein lipase ทำให้เพิ่มการสลาย triglyceride

ผู้ป่วยโรคไต : ผู้ป่วยโรคไต GFR ๖๐-๙๐ ml/min : ลดขนาดยาจากขนาดปกติ ๕๐%
ผู้ป่วยโรคไต GFR ๑๕-๕๙ ml/min : ลดขนาดยาจากขนาดปกติ ๗๕%
ผู้ป่วยโรคไต GFR < ๑๕ ml/min : ห้ามใช้ยาดังกล่าว

อาการข้างเคียง : ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดท้องไม่รุนแรงและปวดหลัง
ภาวะกล้ามเนื้อลายเสียหาย (rhabdomyolysis), ตับอ่อนอักเสบ

ข้อห้ามใช้/ควรระวัง :

ห้ามใช้ : - ผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
- ผู้ป่วยที่ตับทำงานบกพร่อง, โรคถุงน้ำดี, ตับอ่อนอักเสบ

ราคา : ๕.๕๐ บาท/เม็ด

Pregnancy Cat : C



๓. Cilostazol ๕๐ mg. (Citazol®)

ข้อบ่งใช้ : - รักษาอาการขาดเลือดที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายเรื้อรัง

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต :

ผู้ป่วยโรคตับ : ผู้ป่วยโรคตับระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง

ผู้ป่วยโรคไต : ผู้ป่วยโรคไตที่มีค่า CrCl < ๑๕ ml/min : ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง

- ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของภาวะเนื้อสมองตายเนื่องจากหลอดเลือด
อุดตัน (Cerebral infaction)

เงื่อนไข : นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)

กลุ่มยา : Antiplatelet agents



ขนาดยา : รับประทาน ๑๐๐ mg. วันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น

กลไกการออกฤทธิ์ : ยับยั้งเอนไซม์ phosphodiesterase (PDE)-5 เบนผล
ๆ

การทำลาย cAMP ลดลง ทำให้มีปริมาณ cAMP เพิ่มขึ้นมีผลทำให้เกิดการ
ขยายของหลอดเลือดและต่อต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

อาการข้างเคียง :

ระบบหัวใจและหลอดเลือด : เกิดหัวใจ แบบ Angina, ความดันโลหิตสูง/ต่ำ, CHF
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, สมองขาดเลือด

ระบบประสาท : กระสับกระส่าย

ระบบทางเดินอาหาร : อาเจียน, เบื่ออาหาร, เกิดแผลในลำไส้และกระเพาะอาหาร

ระบบทางเดินปัสสาวะ : ปัสสาวะเป็นเลือด, ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินหายใจ : หลอดลมอักเสบ หายใจไม่ออก

ข้อห้ามใช้/ควรระวัง :

ห้ามใช้ : - ผู้ป่วยที่แพ้ยานี้

- ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก, ผู้ป่วย CHF,

ควรระวัง : ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย, ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบ,

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันไม่ได้,

ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือมี glucose tolerance ผิดปกติ

ราคา : ๙.๕๐ บาท/เม็ด

Pregnancy Cat : X

๔. Baclofen ๑๐ mg. (Musclofen®)

ข้อบ่งใช้ :

ใช้บรรเทาภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อ



การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต :

ผู้ป่วยโรคตับ : ผู้ป่วยโรคตับรุนแรงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา baclofen

ผู้ป่วยโรคไต : ผู้ป่วยโรคไตรุนแรงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา baclofen

เงื่อนไข : บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ข.

กลุ่มยา : Skeletal Muscle Relaxants
(Stereoselective GABA-B receptor agonist)

ขนาดยา : รับประทาน ๕-๒๐ mg. วันละ ๓ ครั้ง

หลังอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ทันที

(ขนาดยาสูงสุด ๘๐ mg. ต่อวัน)



กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนอง เนการส่งสัญญาณระหว่าง

เซลล์

ประสาทของสมองหรือไขสันหลังที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้
กล้ามเนื้อคลายอาการเกร็งตัวลง



อาการข้างเคียง : ง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ

อ่อนเพลีย เมื่อยล้า

นอนไม่หลับ คลื่นไส้

ปัสสาวะบ่อย

ท้องผูก

ข้อห้ามใช้/ควรระวัง :

ห้ามใช้ : ผู้ที่แพ้ยานี้

ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้

ผู้ป่วยโรคไขข้อเลือดออก (ยามีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด)

ควรระวัง : ยาเพิ่มภาวะบวม/ภาวะตีบตันของหลอดเลือดสมองและหัวใจ

ระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ป่วยโรคไต

ราคา : ๑.๕๐ บาท/เม็ด

Pregnancy Cat : C, X (ไตรมาสสุดท้าย)

